

QUÈ SÓN LES IDP?

SIGNES D'ALERTA ADULTS I PEDIÀTRICS

SIGNES D'ALERTA ADULTS

Més de 2 otitis mitjana en un any

Més de 2 sinusitis greus en un any, en absència d'al·lèrgia

Una pneumònia per any durant més d'1 any

Diarrea crònica amb pèrdua de pes

Infeccions virals recurrents (herpes, berrugues, condilomes)

Necessitat d'antibiòtics intravenosos per curar infeccions

Abscessos profunds en òrgans i/o pell

Candidiasi orofaríngia o cutània

Infeccions per bacteris de la família de la tuberculosi, però poc virulents

Història familiar d'IDP

SIGNES D'ALERTA PEDIÀTRICS

Més de 4 otitis mitjana en un any

Més de 2 sinusitis greus en un any

Més de 2 pneumònies greus en un any

Candidiasi orofaríngia o cutània

Més de 2 mesos de tractament antibiòtic amb poc efecte

Abscessos profunds en òrgans i/o pell

Necessitat d'antibiòtics intravenosos per curar infeccions

Més de 2 infeccions sistèmiques, inclosa sèpsia

Història familiar d'IDP

Altres signes que també poden ser presents són diarrea crònica, malaltia autoimmunitària, limfoproliferaçió i febre recurrent